Пример практического задания

Провести удаление постоянного (временного) зуба с хроническим периодонтитом у ребенка, выбрав требующие для этого инструменты. (ПК-9)

Ответ

«Алгоритм действий студента при удаления зубов у детей со сменным прикусом на фантомах»

Произвести антисептическую обработку рук;

Оценить зуб, подлежащий удалению, степень подвижности, состояние коронки и т.д.

молочный зуб	постоянный зуб
Собрать набор хирургических инструментов (шпатель, серповидная гладилка, щипцы (из набора для молочных зубов)	Собрать набор хирургических инструментов (шпатель, серповидная гладилка, щипцы, кюретажная ложка);
Произвести аппликационную анестезию в зависимости от групповой принадлежности зубов (раствор 20% геля Benzocaini);	Произвести аппликационную анестезию в зависимости от групповой принадлежности зубов (раствор 20% геля Benzocaini);
Через 1-2 минуты выполнить инфильтрационную или проводниковую анестезию при помощи карпульного шприца, анестетика (Sol.Ultracaini 1,7 ml);	Через 1-2 минуты выполнить инфильтрационную или проводниковую анестезию при помощи карпульного шприца, анестетика (Sol.Ultracaini 1,7 ml);
Гладилкой произвести сепарацию круговой связки данного зуба;	Гладилкой произвести сепарацию круговой связки данного зуба;
Наложить щипцы, фиксировать щёчки;	Наложить щипцы, продвинуть, фиксировать щёчки;
Выполнить ротацию/люксацию зуба;	Выполнить ротацию/люксацию зуба;
Выполнить экстирпацию данного зуба;	Выполнить экстирпацию данного зуба;
	Провести кюретаж лунки удалённого зуба;
В течение 5-7 минут наблюдать за формированием кровяного сгустка (гемостаз);	В течение 5-7 минут наблюдать за формированием кровяного сгустка (гемостаз);
Дать послеоперационные рекомендации	Дать послеоперационные рекомендации