

ТЕМА 7

Дифференциальная диагностика периодонтита, периостита, остеомиелита.

Укажите один правильный ответ

1. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ СИМПТОМ ОСТРОГО ПЕРИОСТИТА ОТ ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТЕЙ

- 1) инфильтрат по переходной складке с одной стороны альвеолярного отростка челюсти
- 2) интенсивная боль в челюсти
- 3) отек мягких тканей
- 4) повышение температуры тела до 37-38С

2. ПРИ ОСТРОМ ВЕРХУШЕЧНОМ ПЕРИОДОНТИТЕ БОЛЬ В ЗУБЕ ПРИ НАКУСЫВАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ

- 1) некроза костных балок лунки
- 2) отека и инфильтрации периодонта
- 3) гибели пульпы
- 4) отека пародонта

3. ПЛОТНЫЙ БОЛЕЗНЕННЫЙ ИНФИЛЬТРАТ С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СТОРОНЫ В ОБЛАСТИ РАЗРУШЕННОГО 36 ЗУБА

- 1) острый периодонтита 36 зуба
- 2) острый остеомиелита нижней челюсти
- 3) острый гнойный периостит нижней челюсти
- 4) обострение хронического периодонтита зуба 3.6

4. ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ ПЕРИОСТИТЕ ЧЕЛЮСТИ

- 1) вскрытие и дренирование поднадкостничного абсцесса
- 2) эндодонтическое лечение причинного зуба, динамическое наблюдение
- 3) удаление причинного зуба, назначение противовоспалительной терапии
- 4) вскрытие и дренирование поднадкостничного абсцесса с двух сторон альвеолярного отростка

5. КОНФИГУРАЦИЯ ЛИЦА ИЗМЕНЕНА ЗА СЧЕТ ОТЕКА ВСЕГДА ПРИ

- 1) острой стадии остеомиелита
- 2) хронической стадии остеомиелита
- 3) остром периодонтите
- 4) хроническом периодонтите

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ РТА СОПРОВОЖДАЕТ

- 1) острый периодонтит в области третьего моляра нижней челюсти
- 2) острый периостит с вестибулярной стороны в области первого моляра нижней челюсти
- 3) острый остеомиелит в области второго моляра нижней челюсти
- 4) острый периостит с язычной стороны в области первого моляра

7. НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НИЖНЕЙ ГУБЫ СОПРОВОЖДАЕТ

- 1) острый остеомиелит в области моляров нижней челюсти
- 2) острый периостит нижней челюсти в области моляров
- 3) хронический остеомиелит нижней челюсти в области премоляров
- 4) острый периодонтит в области премоляров нижней челюсти

8. ФОКУС ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ

- 1) в околочелюстных мягких тканях
- 2) в кости
- 3) в надкостнице
- 4) в периодонте причинного и соседних зубов

9. ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ОСТРОГО ПЕРИОДОНТИТА ХАРАКТЕРНО

- 1) отек и гиперемия периодонта
- 2) лейкоцитарная инфильтрация периодонта
- 3) отек и гиперемия периоста
- 4) лейкоцитарная инфильтрация периоста
- 5) лейкоцитарная инфильтрация кости

10. ДЛЯ ПОЗДНЕЙ СТАДИИ ОСТРОГО ПЕРИОДОНТИТА ХАРАКТЕРНО

- 1) отек и гиперемия периодонта
- 2) лейкоцитарная инфильтрация периодонта
- 3) лейкоцитарная инфильтрация периоста
- 4) отек и гиперемия мягких тканей

11. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ СИМПТОМ ОСТРОГО ПЕРИОДОНТИТА ОТ ПЕРИОСТИТА ЧЕЛЮСТЕЙ

- 1) боль в причинном зубе, чувство «выросшего зуба»
- 2) боль, иррадиирующая по ходу тройничного нерва
- 3) отек, инфильтрация слизистой оболочки в проекции корня
- 4) повышение температуры тела до 37С

12.ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ СИМПТОМ ОСТРОГО ПЕРИОДОНТИТА ОТ ПЕРИОСТИТА ЧЕЛЮСТИ

- 1) перкуссия причинного зуба резко болезненна
- 2) перкуссия причинного зуба безболезненная
- 3) боль, иррадиирующая по ходу тройничного нерва
- 4) отек мягких тканей

13.ОБЩИЙ СИМПТОМ ОСТРОГО ПЕРИОСТИТА И ПЕРИОДОНТИТА

- 1) перкуссия причинного зуба резко болезненная
- 2) перкуссия причинного зуба безболезненная
- 3) боль, иррадиирующая по ходу тройничного нерва
- 4) отек мягких тканей лица
- 5) отсутствие отека мягких тканей лица

14.В ПОЛОСТИ РТА ПРИ ПЕРИОСТИТЕ

- 1) инфильтрат в области причинного зуба
- 2) отек, слизистой оболочки в области причинного зуба
- 3) инфильтрат в области нескольких зубов с одной стороны альвеолярного отростка
- 4) инфилт в области нескольких зубов с двух сторон альвеолярного отростка

15.ФОКУС ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ ПЕРИОДОНТИТЕ

- 1) околочелюстные мягкие ткани
- 2) кость
- 3) надкостница
- 4) периодонт

16.ПРИ ОСТРОМ ПЕРИОСТИТЕ КОНФИГУРАЦИЯ ЛИЦА

- 1) не изменена
- 2) всегда изменена за счет отека
- 3) всегда изменена за счет инфильтрата
- 4) изменена в зависимости от локализации инфильтрата

17.В ПОЛОСТИ РТА ПРИ ОСТЕОМИЕЛИТЕ

- 1) инфильтрат в области причинного зуба
- 2) отек слизистой оболочки в области причинного зуба
- 3) инфильтрат в области нескольких зубов с одной стороны альвеолярного отростка
- 4) инфильтрат в области нескольких зубов с двух сторон альвеолярного отростка

18.ПРИ ОСТРОМ ПЕРИОДОНТИТЕ В ОТЛИЧИЕ ОТ ОСТЕОМИЕЛИТА В КОСТИ ПРОИСХОДИТ

- 1) отек, гиперемия костного мозга
- 2) лейкоцитарная инфильтрация костномозговых пространств
- 3) гнойное расплавление кости
- 4) некроз кости

19.СХОЖИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАДКОСТНИЦЕ ПРИ ОСТРОМ ПЕРИОДОНТИТЕ И ПЕРИОСТИТЕ

- 1) отек, гиперемия
- 2) лейкоцитарная инфильтрация
- 3) фибриноидное набухание
- 4) гнойное расплавление
- 5) отслоение

**20.ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ИНФИЛЬТРАЦИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ
МИКРОАБСЦЕССОВ С РАСПЛАВЛЕНИЕМ ТКАНИ
ПЕРИОДОНТА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ**

- 1) острого остеомиелита
- 2) острого альвеолита
- 3) острого периостита
- 4) острого периодонтита

**21.БОЛЬ ПРИ ОСТРОМ ПЕРИОДОНТИТЕ В ОТЛИЧИЕ ОТ
ОСТЕОМИЕЛИТА ЛОКАЛИЗУЕТСЯ**

- 1) в причинном зубе
- 2) в челюсти
- 3) в мягких тканях
- 4) не имеет четкой локализации

**22.БОЛЬ ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ В ОТЛИЧИЕ ОТ
ПЕРИОДОНТИТА ЛОКАЛИЗУЕТСЯ**

- 1) в причинном зубе
- 2) в челюсти
- 3) в мягких тканях
- 4) не имеет четкой локализации

**23.СХОДНЫЙ СИМПТОМ ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ И
ПЕРИОСТИТЕ ЧЕЛЮСТЕЙ**

- 1) интенсивная боль в причинном зубе
- 2) симптом Венсана
- 3) отек мягких тканей лица
- 4) повышение температуры тела до 37С

24.ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ СИМПТОМ ОСТРОГО ПЕРИОДОНТИТА ОТ ПЕРИОСТИТА ЧЕЛЮСТЕЙ

- 1) боль в причинном зубе, усиливающаяся при накусывании
- 2) боль, иррадиирующая по ходу тройничного нерва
- 3) отек, гиперемия слизистой оболочки альвеолярного отростка
- 4) повышение температуры тела до 38С

25.ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ СИМПТОМ ОСТРОГО ПЕРИОДОНТИТА ОТ ПЕРИОСТИТА ЧЕЛЮСТЕЙ

- 1) перкуссия причинного зуба болезненная, чувство «выросшего зуба»
- 2) перкуссия причинного зуба безболезненная
- 3) отек, гиперемия слизистой оболочки альвеолярного отростка
- 4) отек мягких тканей лица

26.РЕЗКО БОЛЕЗНЕННАЯ ПЕРКУССИЯ ПРИЧИННОГО ЗУБА ВЫРАЖЕНА ПРИ

- 1) хроническом периодонтите
- 2) остром периодонтите
- 3) остром периостите
- 4) остром остеомиелите
- 5) хроническом остеомиелите

27.ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ОСТРОМ ПЕРИОДОНТИТЕ

- 1) отек, гиперемия слизистой оболочки в области причинного зуба
- 2) отек, гиперемия слизистой оболочки в области нескольких зубов
- 3) инфильтрация и гиперемия слизистой оболочки в области нескольких зубов с одной стороны альвеолярного отростка
- 4) инфильтрация и гиперемия слизистой оболочки в области нескольких зубов с двух сторон альвеолярного отростка

28.ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ОСТРОМ ПЕРИОСТИТЕ

- 1) отек, гиперемия слизистой оболочки в области причинного зуба
- 2) отек, гиперемия слизистой оболочки в области нескольких зубов
- 3) инфильтрация слизистой оболочки в области нескольких зубов с одной стороны альвеолярного отростка
- 4) инфильтрация слизистой оболочки в области нескольких зубов с двух сторон альвеолярного отростка

29.ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ

- 1) отек, гиперемия слизистой оболочки в области причинного зуба
- 2) отек, гиперемия слизистой оболочки в области нескольких зубов
- 3) инфильтрация слизистой оболочки в области нескольких зубов с одной стороны альвеолярного отростка
- 4) инфильтрация слизистой оболочки в области нескольких зубов с двух сторон альвеолярного отростка

30.ДЛЯ КОЛЛАТЕРАЛЬНОГО ОТЕКА МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПРИ ПЕРИОСТИТЕ ХАРАКТЕРНО

- 1) конфигурация лица не изменена
- 2) инфильтрация слизистой оболочки в области нескольких зубов с одной стороны альвеолярного отростка
- 3) изменение конфигурации лица, кожа в цвете не изменена, в складку собирается
- 4) плотный инфильтрат, кожа гиперемирована, в складку не собирается

31. РАСШИРЕНИЕ ПЕРИОДОНТАЛЬНОЙ ЩЕЛИ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- 1) острого периодонтита
- 2) хронического периостита
- 3) острого периостита
- 4) острого остеомиелита
- 5) хронического остеомиелита

32. СИМПТОМ ВЕНСАНА ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- 1) остром периодонтите
- 2) хроническом периодонтите
- 3) остром периостите
- 4) остром остеомиелите
- 5) хроническом остеомиелите

33. ВЫРАЖЕННАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ ОРГАНИЗМА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

- 1) острого периодонтита
- 2) хронического периодонтита
- 3) острого периостита
- 4) хронического остеомиелита
- 5) острого остеомиелита

34. ГНОЙНАЯ ИНФИЛЬТРАЦИЯ КОСТНОГО МОЗГА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

- 1) острого периодонтита
- 2) хронического периодонтита
- 3) острого остеомиелита
- 4) острого периостита
- 5) хронического остеомиелита

35.ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ ПЕРКУССИЯ

- 1) безболезненна всех зубов в очаге воспаления
- 2) болезненна только причинного зуба
- 3) болезненна всех зубов в очаге воспаления
- 4) слабоболезненна причинного зуба, болезненна соседних зубов
- 5) болезненна причинного зуба, слабоболезненна соседних зубов

36.БОЛЕЗНЕННАЯ ПЕРКУССИЯ ЗУБОВ В ОЧАГЕ ВОСПАЛЕНИЯ И МЕНЕЕ БОЛЕЗНЕННАЯ ПРИЧИННОГО ЗУБА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

- 1) острого периодонтита
- 2) хронического периодонтита
- 3) острого периостита
- 4) хронического остеомиелита
- 5) острого остеомиелита

37.ПОДВИЖНОСТЬ ПРИЧИННОГО ЗУБА, А ТАКЖЕ СОСЕДНИХ ЗУБОВ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

- 1) острого периодонтита
- 2) хронического периодонтита
- 3) острого периостита
- 4) острого остеомиелита
- 5) хронического остеомиелита

38.ПРИЧИННЫЙ ЗУБ ПРИ ОСТРОМ ПЕРИОСТИТЕ ЧЕЛЮСТИ

- 1) удаляют всегда
- 2) удаляют по показаниям
- 3) не удаляют
- 4) шинируют с соседними зубами

39.ПРИЧИННЫЙ ЗУБ ПРИ ОСТЕОМИЕЛИТЕ

- 1) удаляют всегда
- 2) удаляют по показаниям
- 3) не удаляют
- 4) шинируют с соседними

Укажите несколько правильных ответов

40.СХОДНЫЕ СИМПТОМЫ ПРИ ОСТРОМ ПЕРИОСТИТЕ И ОСТЕОМИЕЛИТЕ ЧЕЛЮСТЕЙ

- 1) интенсивная боль в челюсти
- 2) наличие признаков интоксикации
- 3) отек, гиперемия слизистой оболочки альвеолярного отростка в области причинного и соседних зубов
- 4) инфильтрат по переходной складке только с вестибулярной стороны

41.ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ ОСТРОГО ПЕРИОСТИТА ОТ ПЕРИОДОНТИТА

- 1) перкуссия причинного зуба болезненная
- 2) перкуссия причинного зуба слабоболезненная
- 3) инфильтрат по переходной складке
- 4) отек мягких тканей лица
- 5) отсутствие отека мягких тканей лица

42.ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ ОСТРОГО ПЕРИОСТИТА ОТ ПЕРИОДОНТИТА

- 1) конфигурация лица не изменена
- 2) отек мягких тканей лица
- 3) выраженная реакция регионарных лимфатических узлов
- 4) перкуссия причинного зуба болезненная
- 5) инфильтрат по переходной складке

43.ОТСУТСТВИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В КОСТИ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- 1) острого периодонтита
- 2) хронического периодонтита
- 3) острого периостита
- 4) острого остеомиелита
- 5) хронического остеомиелита

44.ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ ОСТРОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ОТ ПЕРИОСТИТА ЧЕЛЮСТЕЙ

- 1) интенсивная боль в челюсти
- 2) отек мягких тканей лица
- 3) инфильтрат по переходной складке с оральной стороны
- 4) инфильтрат по переходной складке с двух сторон альвеолярного отростка
- 5) повышение температуры тела до 37 С

45.ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОМИЕЛИТА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

- 1) удаление причинного зуба
- 2) вскрытие, дренирование гнойных очагов
- 3) вскрытие полости причинного и соседних зубов, создание оттока через канал
- 4) остеоперфорация компактной пластинки
- 5) шинирование причинного и соседних зубов

46.ОГРАНИЧЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ РТА ВОЗНИКАЕТ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОСТЕОМИЕЛИТА

- 1) в области нижних моляров
- 2) в области ветви нижней челюсти
- 3) в области подбородочного отверстия
- 4) в области бугра верхней челюсти
- 5) в области резцов и клыков нижней челюсти

47.ОСТЕОПЕРФОРАЦИЯ КОСТИ ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СПОСОБСТВУЕТ

- 1) снижению внутрикостного давления
- 2) созданию лучшего оттока
- 3) заживлению раны
- 4) формированию свищевого хода
- 5) ограничению зоны воспаления в кости

48.МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРОМ ПЕРИОСТИТЕ И ОСТЕОМИЕЛИТЕ

- 1) вскрытие, дренирование поднадкостничных гнойных очагов
- 2) антибактериальная терапия
- 3) дренирование раны
- 4) антисептическая обработка
- 5) дезинтоксикационная терапия

49.ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ В ОТЛИЧИЕ ОТ ОСТРОГО ПЕРИОСТИТА

- 1)выраженная интоксикация организма
- 2)нет реакции регионарных лимфатических узлов
- 3)всегда изменена конфигурация лица
- 4)перкуссия соседних зубов болезненна
- 5)перкуссия соседних зубов безболезненна

50.ХАРАКТЕР БОЛИ ПРИ ОСТРОМ ПЕРИОДОНТИТЕ

- 1) боль приступообразная со светлыми промежутками
- 2) боль в зубе и челюсти с иррадиацией
- 3) интенсивная боль в челюсти
- 4) боль в причинном зубе
- 5) боль ноющая, усиливается при накусывании